



Fungizidstrategie 2012

Bekämpfung von Peronospora und Oidium

Wasseraufwand l/ha	400	600	800	1000	1200-1400	1600	1600	1600
 Peronospora – Falscher Mehltau	Kontaktmittel		Fantic® F (0,15%) 1,2–2,1 kg/ha			optimaler Einsatz zur letzten Vorblüte und ersten Nachblüte; max. 3 Anwendungen insgesamt		bei hohem Infektionsdruck; wirkt kurativ bis 1-2 Tage nach Infektionsbeginn; max. 8 Anwendungen
 Oidium – Echter Mehltau	Netzschwefel		Discus® (0,015%) 0,12–0,24 kg/ha			Discus: max. 3 Anwendungen, max. 2 in Folge		
	Austrieb ES 00–09	1. Vorblüte ES 51–53	Letzte Vorblüte ES 53–57	Abgehende Blüte ES 68	1. Nachblüte ES 69–73	Vor Traubenschluss ES 75–77	Nach Traubenschluss ES 79–80	Abschluss ES 81–83

Fantic F zur letzten Vorblüte und abgehenden Blüte: schützt den Neuzuwachs
Aktuan ab der 1. Nachblüte mit kurativer Wirkung; „Feuerwehrmittel“ bei Ölflecken

Beitrag zum Resistenzmanagement:

- hoher Anteil Folpet in Fantic F
- Wirkstoffgruppenwechsel

