

# GEGEN FALSCHEN MEHLTAU

GREIFEN SIE ZU

## AKTUAN®

- Sinnvolle Ergänzung zwischen systemischem Wirkstoff Cymoxanil und Kontaktwirkstoff Dithianon
- Heilende Wirkung bis 36 h; wichtig bei starkem Infektionsdruck und verzögerter Behandlung nach Niederschlägen
- Cymoxanil mit multiplem Wirkungsmechanismus (mehrere Wirkorte)
- Hemmung der Infektion und Verhinderung der Sporulation = keine weitere Ausbreitung des Pilzes
- Spritzungen sollten v.a. vorbeugend durchgeführt werden



 **Stähler**








**NEU**  
WIEDER LANGFRISTIG  
ZUGELASSEN

SCHONT BIENEN UND  
RAUBMILBEN

DAUERHAFTE UND  
REGENFESTE WIRKUNG

JETZT NEU:  
IMPORTTOLERANZ FÜR  
USA UND JAPAN

### OPTIMALER EINSAATZEITPUNKT FÜR AKTUAN IN HOPFEN

						
A	21–29	31–33	34–39	61–69	71–74	81–89
Peronospora, (Sekundärinfektion) Wirkstoffwechsel nach jeder Anwendung	AKTUAN® 1,5–2,4 kg/ha (0,15 %)		AKTUAN® 2,7–3,5 kg/ha (0,15 %)		Kontakt- fungizid	

<b>WIRKSTOFFE</b>	Cymoxanil 100 g/kg + Dithianon 250 g/kg
<b>FORMULIERUNG</b>	WP
<b>KONZENTRATION</b>	0,15 %
<b>ANWENDUNGEN</b>	max. 5 pro Saison; Wirkstoffwechsel nach jeder Anwendung
<b>WIRKUNGSART</b>	Cymoxanil: systemisch (heilend) Dithianon: Kontakt
<b>WIRKUNGSDAUER</b>	12–14 Tage; bei starkem Infektionsdruck und starkem Zuwachs max. 10 Tage
<b>WARTEZEIT</b>	14 Tage
<b>GEWÄSSERABSTÄNDE</b>	90 %*): 20 m
<b>GEBINDE</b>	1 kg, 10 kg

\*) Abdriftminderungsklasse



**Hopfen**



Rebe + Wein



Obst



Forst



Gemüse



Gartenbau



Ackerbaukulturen

STÄHLER MACHT DIE ERNTE STARK

[www.staehler.com](http://www.staehler.com)

# GEGEN ECHTEN MEHLTAU

GREIFEN SIE ZU

# BAYFIDAN®

- Wirkt vorbeugend und heilend
- Besonders wirtschaftlich in den frühen Stadien
- Gute Dauerwirkung
- Praxiserprobt und sicher bis zur Abschluss-spritzung
- Unverzichtbar bei Infektionsgefahr
- Wichtiger Partner im Resistenzmanagement



## BAYFIDAN – ZUVERLÄSSIG GEGEN ECHTEN MEHLTAU IN HOPFEN

A	21–29	31–33	34–39	61–69	71–74	81–89
		BAYFIDAN®		BAYFIDAN®		BAYFIDAN®
		1,2 l/ha		1,65 l/ha		2,5 l/ha

WIRKSTOFF	250,7 g/l Triadimenol
FORMULIERUNG	EC
KONZENTRATION	0,075 %
ANWENDUNGEN	max. 4
WIRKUNGSART	vorbeugend und heilend
WIRKUNGSDAUER	bis zu 3 Wochen
WARTEZEIT	21 Tage
GEWÄSSERABSTÄNDE	50 %*: 20 m, 75 %: 20 m, 90 %: 15 m
GEBINDE	1 l, 5 l

\*1) Abdriftminderungsklasse

BAYFIDAN BEUGT BEI REGELMÄSSIGEM EINSATZ MEHLTAU-INFESTIONEN AN BLATT UND DOLDEN SICHER VOR.

IMPORTTOLERANZ FÜR JAPAN

Unsere neue Beratungs-Hotline:  
**(041 41) 92 04 905**

Stähler Deutschland GmbH & Co. KG  
Postfach 2047, 21660 Stade, Tel. (0 41 41) 92 04 - 0, Fax (0 41 41) 92 04 11,  
info@staehler.com, www.staehler.com

Diese Druckschrift dient der Information. Sie ersetzt nicht das Lesen der ausführlichen Gebrauchsanleitung.  
© Die Produktnamen sind registrierte Marken der Hersteller.