


Empfehlung Weizen – ohne Strobilurin




Breitbandbehandlung gegen Blatt- und Ährenkrankheiten, keine/geringe Halmbruchgefahr

Absicherung Septoria tritici

*) Haupteinsatzzeit: ab Blatthütchenstadium (BBCH39), Spritzung bei Bedarf wiederholen

Empfehlung Weizen – mit Strobilurin




Breitbandbehandlung gegen Blatt- und Ährenkrankheiten, keine/geringe Halmbruchgefahr

1,0 l/ha Matador*)


Tankmischung mit Strobilurin + Chlorthalonil

0,7 l/ha Matador + 1,8 l/ha Amistar Opti



*) Haupteinsatzzeit: ab Blatthütchenstadium (BBCH39), Spritzung bei Bedarf wiederholen

Empfehlung Roggen




Breitbandbehandlung gegen Blatt- und Ährenkrankheiten, keine/geringe Halmbruchgefahr

1,0 l/ha Matador*)

Tankmischung mit Strobilurin, bei nur geringem Infektionsdruck und spätem Rost Einsatz so spät wie möglich

0,7 l/ha Matador + Strobilurinpartner



*) Haupteinsatzzeit: ab Blatthütchenstadium (BBCH39), Spritzung bei Bedarf wiederholen

Matador[®] – das **Extra** für Sie

- Verlässlicher Partner auch gegen *Septoria tritici* (!)
- Erfasst bei der zugelassenen Anwendung gegen Ährenseptoria auch Fusarien und HTR = DTR
- Lange Wirkungsdauer
- Super Mischpartner z.B. für Strobilurine wie Amistar[®] Opti oder andere Strobilurinpartner
- Neue langfristige Zulassung = flexible Gewässerabstände:
 - 50% 5 m, 75% 5 m, 90% *
- Auch in Raps zugelassen

NEU!

NEU!