

# Steckbrief Fantic<sup>®</sup> M

- Wirkstoffe : 40 g/kg Benalaxyl-M + 650 g/kg Mancozeb
- Wirkstoffgruppen : Phenylamid + Dithiocarbamat
- Formulierung : wasserlösliches Pulver (WP)
- Kartoffelfungizid zur Bekämpfung von *Phytophthora infestans*
- Systemische Wirkung (Benalaxyl-M)
- Kontaktwirkung (Mancozeb).
- Konsequenz: kurative und protektive Eigenschaften
- Abpackung: 10 kg - Sack

The logo for Fantic M, featuring the word "Fantic" in a blue, italicized, sans-serif font, followed by "M" in a white, bold, sans-serif font inside a blue oval. The logo is positioned in the bottom right corner of the slide.

## Fantic<sup>®</sup> M – das **Extra** für Sie

- Ideale Kombination der Wirkungsprinzipien „kontakt“ und „systemisch“
- Sehr gute Bekämpfungsleistung bei sensibler Phytophthora
- Sensitivitätssteuerung sehr gut in der Praxis umzusetzen durch frühen Einsatz bei 2 Anwendungen
- Zusatzwirkung bei der zugelassenen Anwendung gegen Alternaria (typischer Befallsanstieg ab Mitte/Ende Juli)
- Sehr gute Pflanzenverträglichkeit

The logo for Fantic M, featuring the word "Fantic" in a blue, italicized, sans-serif font, followed by "M" in a white, bold, sans-serif font inside a blue oval. The logo is positioned in the bottom right corner of the slide.

# Steckbrief Zetanil<sup>®</sup> M

## Zetanil<sup>®</sup> M

---

### Neues Fungizid gegen Kraut- und Knollenfäule

Formulierung	Wasserlösliches Pulver
Wirkstoff	40 g/kg Cymoxanil + 400 g/kg Mancozeb
Wirkstoffklasse	Cyanoacetamide-oxime + Dithiocarbamat
Wirkstoffaufnahme	Translaminar und Kontakt
Wirkungsweise	kurativ und protektiv
Aufwandmenge	3,0 kg/ha in 200 - 400 l Wasser /ha
Max. Zahl der Anwendungen	4



## Zetanil® M – das **Extra** für Sie


- Ideale Kombination der Wirkungsprinzipien „kontakt“ und „teilsystemisch“
- Sehr gute Bekämpfungsleistung bei sensibler Phytophthora
- Sensitivitätssteuerung sehr gut in der Praxis umzusetzen durch wechselnde Wirkungsprinzipien im gesamten Spritzprogramm
- Zusatzwirkung bei der zugelassenen Anwendung gegen Alternaria (typischer Befallsanstieg ab Mitte/Ende Juli)
- Sehr gute Pflanzenverträglichkeit
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis zur vorbeugenden Behandlung bei niedrigem, mittlerem und hohem Infektionsdruck
- Zusatzversorgung mit dem Spurenelement Mangan
- Bei 90% Abdriftminderung kein Mindestabstand zu Oberflächengewässern



# Stähler – Fungizidsystem in Kartoffeln

hoch  
Infektions-  
druck  
niedrig

<p><b>NEU</b></p> <p><b>Fantic® M</b> max. 2 Anwendungen im Abstand von 7-10 Tagen</p>	<p>Ggf. <b>Kontaktmittel</b> mit sporenabtötender Wirkung</p>	<p><b>NEU</b></p> <p><b>Zetanil® M *)</b> max. 4 Anwendungen im Abstand von min. 7 Tagen</p>	<p>Kontaktmittel mit sporenabtötender Wirkung</p>	
	<p><b>NEU</b></p> <p><b>Fantic® M</b> max. 2 Anwendungen im Abstand von 7-10 Tagen</p>	<p><b>Zetanil® M*)</b></p>		<p><b>Tridex DG</b></p>
	<p><b>Fantic® M</b> max. 2 Anwendungen im Abstand von 7-10 Tagen</p>	<p><b>Tridex DG</b></p>		



Beginn Spritzfolge

Hauptwachstumsphase

Abreife

\*) ggf. in Tankmischung mit reduzierten Aufwandmengen oder in Wechsel mit anderen Mitteln