

Steckbrief Successor TOP Pack

Fertigpack aus den sich ideal ergänzenden Herbiziden Successor T und Mikado

Steckbrief Successor T:

- Flüssiges vorwiegend **bodenaktives** (Verhältnis ca: 80:20) Nachauf-
laufherbizid mit dem neuen Wirkstoff **Pethoxamid** zur
sicheren Bekämpfung von Schadhirsen,
Einjährigem Rispengras und
zweikeimblättrigen Unkräutern in Mais
- Wirkstoffe: 300 g/l Pethoxamid
187,5 g/l Terbutylazin
- Suspoemulsionskonzentrat (SE)

Steckbrief Mikado:


- Flüssiges überwiegend **blattaktives**
(Verhältnis ca. 65:35) Nachauf-
laufherbizid mit einer zusätzlichen
Wirkungskomponente zur Aufnahme über
die Wurzel
- Wirkstoff: 300 g/l Sulcotrione
- Suspensionskonzentrat (SC)

Abpackung: 2 x10 l Successor T + 5 l Mikado

Empfehlung Successor® TOP Pack

Hirse-Standorte

Einsatzzeitpunkt Hühnerhirse:
im 3-Blattstadium der Hirse



3,75 l/ha Successor TOP Pack:
3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado

Einsatzzeitpunkt Borstenhirse:
beim Auflaufen der Hirse

Verspäteter Einsatzzeitpunkt:
ab 3-Blattstadium der Borstenhirse

5,0 l/ha Successor TOP Pack:
4,0 l/ha Successor T + 1,0 l/ha Mikado

3,0 l/ha Successor T + 0,5 l/ha Mikado
+ 30 g/ha Titus + FHS

Einsatzzeitpunkt Fingerhirse:
im 1-Blattstadium der Hirse



5,0 l/ha Successor TOP Pack:
4,0 l/ha Successor T + 1,0 l/ha Mikado


Zusatzwirkung

Zweikeimblättrige Unkräuter,
Teilwirkung auf Borsten-, Finger-
und Gabelblütige Hirse

Finger-, Hühner-, Gabelblütige Hirse,
zweikeimblättrige Unkräuter

Gräser, Hühnerhirse,
zweikeimblättrige Unkräuter

Hühnerhirse, zweikeimblättrige
Unkräuter; Teilwirkung auf Borsten-
und Gabelblütige Hirse




Empfehlung Successor® TOP Pack



Standorte mit Mischverunkrautung - ohne Hirsen

Einsatzzeitpunkt Unkräuter:
Unkrautgröße: bis max. 4 cm

2,5-3,0 l/ha Successor TOP Pack:
2,0-2,4 l/ha Successor T
+ 0,5-0,6 l/ha Mikado



Tipps:

Bei Auftreten von Gräsern wie z.B. Ackerfuchsschwanz und Quecke ist der Zusatz von Sulfonylharnstoffen (z. B. Titus®, 30 g/ha + FHS) zu empfehlen.

Bei extrem hohem Unkrautdruck (insb. Kamille, Knöterich) und/oder niedriger Luftfeuchtigkeit empfiehlt sich eine Nachbehandlung bzw. Zumischung z.B. von 0,3 l/ha Bucril®.



Successor[®] TOP Pack - das **Extra** für Sie



- Optimale **Kombination aus blatt- und bodenaktiven Wirkstoffen**
- Neuer Wirkstoff Pethoxamid mit **hervorragender Dauerwirkung (bis zu 11 Wochen nach der Anwendung)** einschließlich Hühner- und Fingerhirse und zur Erfassung bereits Triazin-resistenter Unkrautarten
- Sehr gute **Pflanzenverträglichkeit**
- **Breit wirksame** und wirtschaftliche Wirkstoffkombination zur Minimierung der Überfahrten
- Gute Basiswirkung gegen Kartoffeldurchwuchs
- **Einsatz flexibel** im frühen Nachauflauf bis max. 4-Blattstadium des Maises
- Bei Auftreten von Borstenhirse, Ackerfuchsschwanz, Quecke ist der Zusatz von Sulfonylharnstoffen (z. B. Cato/Titus, 30 g/ha + FHS) zu empfehlen.
- Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten seit 2007 ...
 - ...flexible Abstände zu Oberflächengewässern bis zu 0 m (Länderregelung beachten)
 - ...Einsatz auch auf drainierten Flächen möglich

