


Successor[®] T- Pack


Boden- und Blattwirkung, ein Fall für Zwei



Successor[®] T - Steckbrief




Steckbrief	Successor T
Wirkstoffe	300 g/l Pethoxamid, 187,5 g/l Terbutylazin
Formulierung	Suspensionskonzentrat (SE)
Wirkstoffgruppe	Chloracetamide , Triazine; HRAC-Klasse: K3, C1
Wirkungsweise	Boden- und Blattwirkung
Aufwandmenge	Zugelassen: 4,0 l/ha
Anzahl der Anwendungen	Max. 1 Anwendung
Zugelassene Kulturen	Mais
Zugelassen bis	31.12.2011
Abstände	NW605 5,5,*; NW606 10; NW706 20; NT108 5 m 75 % 20 m
Bienen	B4
Gebindegröße	10 l-Kanister



Caracho® 235 - Steckbrief



Steckbrief	Caracho 235
Wirkstoff	235 g/l Bromoxynil
Formulierung	Emulsionskonzentrat
Wirkstoffgruppe	Nitrile, HRAC-Klasse: C3
Wirkungsweise	Blattwirkung, Photosynthese II-Hemmer
Aufwandmenge	Zugelassen: 0,75 - 1,5 l/ha
Anzahl der Anwendungen	Max. 1 Anwendung
Zugelassene Kulturen	Mais, Sorghum-Hirse, Luzerne, Rotklee, Gräser
Zugelassen bis	31.12.2015
Abstände	NW605 5,5,*; NW606 15; NT102 75 % 20 m, NW705 5 m
Bienen	B4
Gebindegröße	5 l-Kanister



Successor T- Pack – Wirkungs- spektrum

	Successor T	Caracho 235	Successor T-Pack
Ackerfuchsschwanz			
Ackerhellerkraut			
Ackersenf			
Ackerstiefmütterchen			
Amarant			
Ausfallraps			
Borstenhirse			
Ehrenpreis			
Einjährige Rispe			
Fingerhirse			
Flughafer			
Franzosenkraut			
Hederich			
Hirtentäschel			
Hohlzahn, Acker-			
Hühnerhirse			
Kamillearten			
Klatschmohn			
Klettenlabkraut			
Kreuzkraut, Gemeines-			
Melde			
Nachtschatten			
Quecke			
Raukearten			
Saat-Wucherblume			
Storchschnabel, Arten-			
Taubnessel			
Trespe			
Vergissmeinnicht			
Vogelmiere			
Windenknöterich			
Windhalm			



	95 % und mehr
	90 % und mehr
	unter 90 %
	nicht bewertet



Empfehlung Successor® T - Pack




Standorte mit Mischverunkrautung

Einsatzzeitpunkt Unkräuter:
Unkrautgröße: bis max. 4 cm

2,3 l/ha Successor T - Pack:
2,0 l/ha Successor T
+0,3 l/ha Caracho 235

Bei Bedarf
Nachputzen mit
bis zu 0,3 l/ha Caracho235



Wichtig:

Bei Auftreten von Gräsern wie z.B. Ackerfuchsschwanz und Quecke ist der Zusatz von Sulfonylharnstoffen (z. B. Cato®, 30 g/ha + FHS) zu empfehlen. Bei Hühnerhirse 0,5 l/ha Mikado ergänzen → **Successor TOP Pack**





Successor[®] T - Pack - das **Extra** für Sie

- Wirkstoff Pethoxamid mit **hervorragender Dauerwirkung (bis zu 11 Wochen nach der Anwendung)** einschließlich Hühner- und Fingerhirse und zur Erfassung bereits Triazin-resistenter Unkrautarten
- Sehr gute **Pflanzenverträglichkeit**
- **Breit wirksame** und wirtschaftliche Wirkstoffkombination zur Minimierung der Überfahrten
- Gute Basiswirkung gegen Kartoffeldurchwuchs
- **Einsatz flexibel** im frühen Nachauflauf bis max. 4-Blattstadium des Maises
- **Caracho 235** wirkt blattaktiv gegen zweikeimblättrige Unkräuter einschl. Klettenlabkraut und Kamille-Arten und verstärkt die TBA-Komponente in Successor T
- Bei Auftreten von Borstenhirse, Ackerfuchsschwanz, Quecke ist der Zusatz von Sulfonylharnstoffen (z. B. Cato, 30 g/ha + FHS) zu empfehlen.

