

**Wir heißen Sie
herzlich willkommen!**

Domark[®]

10 EC



Domark
10 EC

Versuchsergebnisse


GEP-Versuche 2003/2004

Domark® 10 EC

GEP-Versuchsergebnisse 2003-2004

Prüfvariante: Doppelbehandlung mit 1,0 l/ha Domark 10 EC

Vergleichsvariante: Doppelbehandlung mit Vergleichsmittel




Domark® 10 EC

GEP-Versuchsergebnisse 2003-2004

Prüfvariante: Doppelbehandlung mit 1,0 l/ha Domark 10 EC

Vergleichsvariante: Doppelbehandlung mit Vergleichsmittel




Domark® 10 EC

GEP-Versuchsergebnisse 2003-2004

Prüfvariante: Doppelbehandlung mit 1,0 l/ha Domark 10 EC

Vergleichsvariante: Doppelbehandlung mit Vergleichsmittel




Domark® 10 EC

GEP-Versuchsergebnisse 2003-2004

Prüfvariante: Doppelbehandlung mit 1,0 l/ha Domark 10 EC

Vergleichsvariante: Doppelbehandlung mit Vergleichsmittel




Domark® 10 EC

Zusammenfassung GEP-Versuchsergebnisse 2003-2004

Prüfvariante: Doppelbehandlung mit 1,0 l/ha Domark 10 EC

Vergleichsvariante: Doppelbehandlung mit Vergleichsmittel




Domark® 10 EC

GEP-Versuchsergebnisse 2003-2004

Prüfvariante: Doppelbehandlung mit 1,0 l/ha Domark 10 EC

Vergleichsvariante: Doppelbehandlung mit Vergleichsmittel



Fazit:


Leichte Reduzierung der Melassebildner d.h. der Ausbeuteverluste durch Domark 10 EC

Domark® 10 EC

GEP-Versuchsergebnisse 2003-2004

Prüfvariante: Doppelbehandlung mit 1,0 l/ha Domark 10 EC

Vergleichsvariante: Doppelbehandlung mit Vergleichsmittel




Domark® 10 EC

GEP-Versuchsergebnisse 2003-2004

Prüfvariante: Doppelbehandlung mit 1,0 l/ha Domark 10 EC

Vergleichsvariante: Doppelbehandlungen mit zwei Vergleichsmitteln




Versuchsergebnisse

orientierender Mittelvergleich 2005/2006

Domark® 10 EC

Versuchsergebnisse - orientierender Mittelvergleich 2005


Versuchsansteller: ALR Kiel, Anwendung: vorbeugender Einsatz



Versuchsergebnisse - orientierender Mittelvergleich 2005

Versuchsansteller: ALR Kiel, Anwendung: vorbeugender Einsatz am 03.08.2005

Bonitur am 23.09.2005




Domark® 10 EC

Versuchsergebnisse - orientierender Mittelvergleich 2006

Versuchsansteller: 6 Prüfstellen bundesweit,
Bonitur: Ø 68 Tage nach (Einmal-) Behandlung

Vergleichsvariante: (Einmal-) Behandlung mit Vergleichsmittel




Domark® 10 EC

Versuchsergebnisse - orientierender Mittelvergleich 2006

Versuchsansteller: 6 Prüfstellen bundesweit

Vergleichsvariante: (Einmal-) Behandlung mit Vergleichsmittel



EIN GUTES BLATT MIT DOMARK® 10 EC



Neuer systemischer
Wirkstoff

Rüben 

Getreide 

Mais 

Raps 

Kartoffeln 

Haus & Hof 

Sonderkulturen 

STÄHLER MACHT DIE ERNTE STARK

www.staehler.com