


Pflanzenschutz in Steinobst



Empfehlung für Kirschen

gegen Kirschfruchtfliege
 0,125 g/ha je m Kronenhöhe
 1 – 2 Anwendungen
 im Abstand von 8 – 14 Tagen
 Wartezeit: 14 Tage/21 Tage

Mospilan® SG*



31	55	59	61	71	81	91
Triebentwicklung	Entwicklung der Blütenanlagen	Ballonstadium	Blüte	Fruchtentwicklung	Fruchtreife	Abschluss der Vegetation

* erneute Genehmigung nach § 11 PflSchG vorausgesetzt

Empfehlung für Pflaumen

Freifressende Schmetterlingsraupen
(ausg. Wollspinner, Trägspinner und Eulen)

Dipel ES 0,1%
(0,5 l/ha u. mKh)

Para Sommer 3 %
(15 l/ha u. mKh)

Spinnmilben, Schildläuse¹⁾ (Wintereier)

Spinnmilben, Gallmilben

Kiron 0,15 %
(0,75 l/ha u. mKh)

Pflaumensägewespe

Mospilan SG 0,025%
(0,125 kg/ha u. mKh)

Blattläuse

Mospilan SG 0,025%
(0,125 kg/ha u. mKh)

BBCH-Stadium	00	10	31	51	61	71	81	91
	Austrieb	Blatt- entwicklun g	Trieb- entwicklun g	Entw. der Blüte	Blüte	Frucht- entwicklun g	Fruchtreife	Vegetation s-schluss

1) Werden bei der Bekämpfung von Spinnmilben (Wintereier) miterfasst