

Erneut überzeugende Wirkung auch unter trockenen Verhältnissen 2008



Wirksamkeit (in %) von Successor TOP Pack (Successor T + Mikado) gegen Hirse und zweikeimblättrige Unkräuter in Mais 2008

Zusammenfassung von 15 Versuchen
(Spritzung BBCH 11-14, Abschlussbonitur ca. 50 - 60 Tage nach der Spritzung)

Prüfstelle	Hünerhirse (ECHCG)		Fingerhirse (DIGSA)		Borstenhirse (SETVI)		Einj. Rispe (POAAN)		Ambrosia (AMBSS)		W. Gänsefuß (CHEAL)		Acker-Minze (MENAR)		W-knötlich (POLCO)		Nachtschatten (SOLNI)		Vogelmiere (STEME)	
	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2	4,0 l/ha Successor T + 1,0 l/ha Mikado	1,25 l/ha VM1 + 1,5 l/ha VM2	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2
Agathenburg*	100	95					89	83			99	98			100	100	98	98		
Ahlerstedt*	98	96			50	50	93	90			100	100			93	93				
Fredenbeck*	95	95					97	98			96	99	90	94			99	100		
Osnabrück			89	89							99	96							100	100
Bremervörde					45	48									94	96			100	100
Bayreuth**	100	83			83	80					100	100								
Brandenb.-Nuhnen	89									99							100			
Brandenb.-Wünsdorf											100								100	
BayWa-Versuchsfeld	100										100								100	
Aurich	73	71					22	20			93	90			96	100			100	100
Thüringen 1									98		100						100			
Thüringen 2											100				100					
Thüringen 3											100				97				100	
Thüringen 4	92										100									
Thüringen 5	92										100				100					
Thüringen 6	96										99									
Mittelwerte	94	88	89	89	59	59	75	75	99		99	97	90	94	97	97	99	99	100	100

* Versuchsdurchführung durch Stähler Deutschland

** 1,25 VM1 + 1,5 l/ha VM2

Erneut überzeugende Wirkung auch unter trockenen Verhältnissen 2008



Wirksamkeit (in %) von Successor TOP Pack (Successor T + Mikado) gegen Hirse und zweikeimblättrige Unkräuter in Mais 2008

Zusammenfassung von 15 Versuchen

(Spritzung BBCH 11-14, Abschlussbonitur ca. 50 - 60 Tage nach der Spritzung)

Hühnerhirse (ECHCG)		Fingerhirse (DIGSA)		Borstenhirse (SETVI)		Einj. Rispe (POAAN)		Ambrosia (AMBSS)		W. Gänsefuß (CHEAL)		W-knöterich (POLCO)		Nachtschatten (SOLNI)		Vogelmiere (STEME)	
3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2	4,0 l/ha Successor T + 1,0 l/ha Mikado	1,25 l/ha VM1 + 1,5 l/ha VM2	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Mikado	1,0 l/ha VM1 + 1,2 l/ha VM2
94	88	89	89	59	59	75	75	99		99	97	97	97	99	99	100	100
besser!		gleich		gleich		gleich		reicht!		besser!		gleich		gleich		gleich	